



BLS-AED-SRC Algorithmus 2015 nach ILCOR CoSTR*

Schnelle Umgebungskontrolle ob sicher
(v.a. bezüglich Intoxikationen und Strom)

Bewusstlose Person
Fehlende oder abnormale Atmung

Nach Hilfe rufen
Alarmierung Tel. 144
AED holen oder anfordern

30 Thoraxkompressionen (100 – 120 /min)
gefolgt von 2 Beatmungsschüssen
oder
Thoraxkompressionen ohne Beatmung

AED trifft ein
Anweisungen des Geräts folgen

Achte auf:

- Thoraxkompression **5 – 6 cm**
bzw 1/3 Brustkorbdurchmesser
bei Kindern mit **minimaler**
Unterbrechung
- Druckpunkt in der **Mitte** des
Brustkorbs
- Komplette **Entlastung**
- Beatmung: Thoraxbewegungen
sichtbar!

Quellen:

- Travers AH, et al., 2015 *International Consensus on Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care Science With Treatment Recommendations. Part 3: adult basic life support and automated external defibrillation: Circulation. 2015;132 (suppl 1):S51–S83.
- Maconochie IK, et al., 2015 International Consensus on Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care Science with Treatment Recommendations Part 6: Pediatric basic life support and pediatric advanced life support., Resuscitation 95 (2015) e147–e168